KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS

THRIPEX

THRIPEX®

THRIPEX-PLUS®

Neoseiulus cucumeris

Producto
Neoseiulus cucumeris (ácaro depredador)

Presentación
Botella de 1000 ml (**código 03750**), bote de 5000 ml (**código 03780**) caja con 100 sobres papel (**código 03700**), caja con 500 sobres papel (**código 03710**).

Contenido: 50,000 y 100,000 ácaros depredadores mezclados con salvado. Los sobres contienen 100 ácaros depredadores más otros ácaros (todos los estadíos) + acaros de la harina (todos los estadios) mezclado con salvado.

Plaga objetivo
Huevos en eclosion, Larvas y jóvenes de varias especies de Trips; Los ácaros depredadores también comen otros ácaros (araña roja, ácaros del fresal, araña blanca y bastantes más), melaza y polen.

Condiciones ambientales
Durante algunas horas del día, la humedad relativa debe estar por encima del 75%, y la temperatura, por encima de 20°C. Durante el día, la RH no debe estar por debajo del 50%. THRIPEX-PLUS contiene una raza de *Neoseiulus cucumeris* que no entra en diapausa. Por ello, este depredador puede funcionar todo el año.

Dosis					
THRIPEX	**Individuos / m2**	**m² / unidad**	**Intervalo (días)**	**Frecuencia**	**Observaciones**
preventiva	**50/m²**	**500/1000**	**14**	**-**	**-**
curativa baja	**100/m²**	**250/500**	**14**	**-**	**-**
curativa alta	**100/m²**	**250/500**	**7**	**-**	**-**

¡Importante! Consultar siempre a un especialista de Koppert para seguir una estrategia apropiada en el uso del producto.

www.koppert.com.mx

KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS

THRIPEX

THRIPEX-PLUS	Individuos / m2	m² / unidad	Intervalo (días)	Frecuencia	Observaciones
preventiva	-	2½	42	-	sólo una vez en cultivos con polen
curativa baja	-	2½	35	-	-
curativa alta	-	¾	28	-	-

Modo de empleo

Thripex

- Invertir y agitar suavemente antes de usar
- BOTELLA: rociar el material sobre las hojas o aplicar en el cultivo con aireación mecánica
- CUBO: aplicar con cuchara en montoncitos de 2,5 ml por planta encima de los bloques de lana de roca, al otro lado del gotero
- Cuando se introduce encima de los bloques de lana de roca, los montones siguen produciendo ácaros depredadores durante algunas semanas. Los ácaros abandonan el montoncito para dispersarse por el cultivo

Thripex plus

- Colgar los sobres en cultivo
- Los sobres ya poseen un orificio de salida
- Coger los sobres por el rectángulo de cartón situado en su parte superior los ácaros depredadores se dañan fácilmente

Almacenamiento

- Tras la recepción: 1-2 días a oscuras.
- Temperatura: 10-15°C.
- Proporcionar ventilación para evitar la acumulación de CO2.

KOPPERT
BIOLOGICAL SYSTEMS

THRIPEX

Morfología

- Formas móviles: beige-rosa, forma de gota, cuerpo 'deprimido' sobre patas cortas, a menudo en lugares escondidos tales como venas y flores
- Huevos: blanco transparente, adheridos a pelos de la hoja a lo largo de venas del envés

Modo de acción

Los ácaros adultos buscan su presa y la succionan hasta dejarla seca.

Importante

Consultar siempre con un especialista de Koppert para seguir una estrategia apropiada en el uso del producto.

THRIPEX PLUS

THRIPEX

KOPPERT MÉXICO
Circuito el Marqués Nte. 82
Parque Industrial El Marqués,
El Marqués, Querétaro.
Tel. 52 (442) 221 6149
pedidos@koppert.com.mx